



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ШКУРКИ ЛИСИЦЫ И КОРСАКА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ, ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14174—89

Издание официальное

5 коп. БЗ 9—89/766

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

Москва

**ШКУРКИ ЛИСИЦЫ И
КОРСАКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ,
ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ**

Технические условия

ГОСТ**14174—89**Undressed skins of fox and corsac fox
obtained by hunting Specifications

ОКП 98 7872, 98 7873 98 7874

Срок действия с 01.07.90
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки лисицы красной, черно-бурой, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки лисиц и корсака должны быть сняты трубкой, с разрезом, проходящим от фаланг пальцев задних конечностей к анальному отверстию по линии волосораздела черева и огузка, с сохранением меха головы (носиком и ушами), лап (с коготками) и хвоста, очищены от остатков мышечной, жировой ткани, сухожилий и хрящей из ушей, костей из лап и хвоста; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; оправлены волосом наружу на правилках (приложение 1) и законсервированы пресно-сухим способом; лапы хорошо расправлены.

1.2. Шкурки лисицы красной характеризуются волосяным покровом на хребте и боках огненно-красного, бледно-алого, красно-серого, серого и светло-серого окраса. Черево красное, красно-серое, серебристое или темно-бурое.

1.3. Шкурки лисицы черно-бурой характеризуются волосяным покровом черного окраса различной интенсивности. Допускаются буроватый или бурый оттенки.

1.4. Шкурки лисицы-крестовки характеризуются волосяным покровом на хребте темно-серого окраса. На шее и плечах ярко выраженный темный крестообразный рисунок; черево и душка темно-серые; лапы темные или темно-серые, пух темно-голубой.

1.5. Шкурки лисицы-сиводушки характеризуются волосяным покровом на хребте и боках темно-бурого, темно-серого, красно-бурого и светло-бурого окраса серебристого оттенка, пух темно-голубой. На шее и лопатках имеется темный крестообразный рисунок; черево, душка, лапы темно-серые или темно-бурые.

1.6. Шкурки корсака характеризуются волосяным покровом на хребте и боках от серебристо-серого до красно-песочного, а на череве серебристо-серого окраса, пух светло-серый, светло-голубой или желто-песочный с различными оттенками.

1.7. Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки и корсака в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Характеристика волосяного покрова	Основные районы распространения
Лисица красная		
Камчатский	Пышный, плотный, шелковистый, слегка упругий, по окрасу огненно-красный, красный, красно-серый, черево преимущественно красное, иногда с темно-бурым пятном, душка серебристая, пышная	Камчатская, Магаданская области, Хабаровский край, Аяно-Маинский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Охотский, Ноглинский, Александрово-Сахалинский и Тымовский районы
Якутский	Пышный, нежный, шелковистый, по окрасу преимущественно красный, черево красное, обычно с большим темно-бурым пятном, душка серебристо-серая	Якутская АССР
Сибирский	Пышный, шелковистый или менее шелковистый, по окрасу ярко-красный, красный, светло-красный или алый, черево красное, иногда с темным пятном, светло-красное, серебристо-серое или грязно-белое, душка белая, бело-голубая, светло-серая, серебристая	Амурская, Иркутская, Читинская, Томская области, Тюменская область, кроме районов, расположенных к югу от линии Тюмень — Тара, Приморский, Красноярский края, Хабаровский край и Сахалинская область, кроме районов, указанных в Камчатском кряже, Бурятская и Тувинская АССР
Западно-Сибирский	Менее пышный, грубоватый, по окрасу алый или светло-алый, черево и душка бело-голубые или грязновато-белые, встречаются шкурки юго-восточных районов пышные, шелковистые и гривастые по окрасу	Алтайский край, Новосибирская, Омская, Кемеровская, Курганская, Тюменская (районы к югу от линии Тюмень — Тара) области, Казахская ССР, Кустанайская область — Федоровский, Джетыгаринский, Семнозерский и Кустанайский

Наименование кряжа	Характеристика воло- сяного покрова	Основные районы распространения
	светло-алые или светло пе- сочные	районы, Тургайская область — Джангильдинский и Амангель- динский районы; Северо-Ка- захстанская область — Прес- новский, Соколовский, Булаев- ский, Ленинский и Советский районы, Кокчетавская об- ласть — Кзылтусский, Энбек- шильдерский, Кокчатавский, Рузаевский, Арык-Балыкский и Шугинский районы
Северный	Пышный, шелковистый или без шелковистости; по окрасу преимущественно красный, черво того же окраса, обычно с темным пятном, душка белая, лапы с широкой темной или чер- ной полосой	Мурманская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Горьковская (районы, распо- ложенные к северу от р Вол- ги), Кировская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, Карельская, Коми, Удмуртская АССР
Центральный	Пышный или менее пыш- ный, грубоватый, по окрасу преимущественно крас- ный или светло-красный черво красное, бледно- красное или белое, иногда с темным пятном, душка белая, лапы рыжие с тем- ными полосами	Ленинградская, Калининская, Новгородская, Московская, Ярославская, Ивановская, Вла- димирская, Брянская, Псков- ская, Смоленская, Орлов- ская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Туль- ская, Рязанская, Ульяновская, Куйбышевская, Оренбургская, Калининградская, Горьковская (районы, расположенные к югу от р. Волги) области, Эстонская, Латвийская, Ли- товская и Белорусская ССР, Марийская, Мордовская, Чу- вашская, Татарская, Башкир- ская АССР
Южный	Низкий грубый или вы- сокий, но редковатый, по окрасу красный, красно се- рый, алый, светло-серый или серый, серо-желтый, черво белое, грязно белое или красно-серое; душка белая или грязно белая, лапы различного окраса с черными или серыми по- лосами	Курская, Белгородская, Са- ратовская, Воронежская, Вол- гоградская, Ростовская, Астра- ханская области, Ставрополь- ский и Краснодарский края, Дагестанская Кабардино-Бал- карская, Чечено-Ингушская, Калмыцкая, Северо-Осетин- ская АССР, Украинская, Мол- давская, Грузинская, Азербай- джанская, Армянская ССР
Семипалатин- ский	Пышный, шелковистый и гривастый, по окрасу преи- мущественно светло-желтый или светло алый	Восточно-Казахстанская, Се- мипалатинская, Карагандин- ская (Шетский район) области Казахской ССР

Наименование кряжа	Характеристика воло- сяного покрова	Основные районы распространения
Средне-Азиат- ский	Низкий, грубовагый или полугрубый, редкий, матовый или шелковистый; по окрасу красно-серый, серый, алый, светло-красный или бледно-желтый	Казахская ССР, кроме областей, указанных в Западно-Сибирском и Семипалатинском кряжах, Киргизская, Узбекская, Турьменская и Таджикская ССР
Лисица-крестовка и лисица-сиводушка		
Камчатский	Пышный, особенно на шейной части и у передних лап, шелковистый, ость длинная	Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ, Хабаровский край (Охотский район), Якутская АССР
Северо-Сибир- ский	Пышный, менее шелковистый, ость длинная	Все районы, кроме указанных в Камчатском и Южном кряжах
Южный	Низкий, грубый с остью, как бы подпаленной на лощах, более низкий на хребте, чем на череве	Ставропольский край (горные районы), Чечено-Ингушская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская АССР, Армянская, Азербайджанская и Грузинская ССР
Корсак		
Казахский	Рослый, мягкий, серебристо-серого окраса; пух светло-серый или светло голубой	Казахская ССР, Оренбургская, Куйбышевская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Читинская области, Алтайский край, Башкирская АССР
Астраханский	Низкий, грубый, серо-песочного или красно-песочного окраса	Все районы, кроме указанных в Казахском кряже

Примечания

- Основным показателем кряжа является характеристика волосяного покрова. Районы распространения являются дополнительным признаком
- Шкурки караганки относят к Средне-Азиатскому кряжу.

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на цвета в соответствии с требованиями табл. 2.

1.9. В зависимости от степени серебристости волосяного покрова шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 2

Цвет	Характеристика окраски волосяного покрова
I	Волосяной покров черный или темный с хорошо выраженной чисто-белой серебристостью, а также чистого светло-серебристого окраса с выраженной вуалью, но с легким коричневым оттенком. Пуховые волосы темно-серые или серые.
II	Волосяной покров темно-бурый, светло-серебристый без вуали (открытая серебристость) или светло-серебристый с буроватым оттенком. Пуховые волосы темно-серые или светло-серые

Таблица 3

Группа	Серебристость волосяного покрова к длине шкурки, %
1	Св 90,0
2	Св. 60,0 до 90,0 включ.
3	Св 30,0 до 60,0 включ.

1.10. Шкурки лисиц и корсака в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани шкурок
Первый	Полноволосый, густой, с развившимися кроющими и пуховыми волосами. Кожевая ткань без синевы. Допускается легкая синева по всей площади шкурки.
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися кроющими и пуховыми волосами, особенно по хребту. Кожевая ткань синеватая.
Третий	Полуволосый, редковатый, со слабо развившимися, низкими кроющими и пуховыми волосами. Кожевая ткань синяя.

Примечание. Шкурки лисицы черно-бурой относят только к первому и второму сорту.

1.11. Шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на размеры в соответствии с требованиями табл. 5.

Таблица 5

Размерная категория	Длина шкурки, см	Ширина шкурки, оправленной трубкой, см
1	От 85,0 и более	Не менее 12,5
2	От 60,0 до 84,9	Не менее 12,5

1.12. В зависимости от наличия пороков шкурки лисец и корсака подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями табл. 6.

Таблица 6

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1 Разрывы и швы общей длиной, см	До 10,0 включ	Св 10,0 До 25,0 включ	Св 25,0 до 50,0 включ	Св 50,0 однократно длины шкурки или перерванные поперек
2 Дыры, вытертые места общей площадью, %	До 0,5 включ	Св 0,5 до 1,0 включ	Св 1,0 до 2,0 включ	Св 2,0 до 4,0 включ
3 Сквозной волос общей площадью к площади шкурки, %	До 10 включ	Св 1,0 до 30 включ	Св 3,0 до 20,0 включ	Св 20,0 до 50,0 включ
4 Плешины общей площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	Не допускаются	До 1,5 включ	Св 1,5 до 2,5 включ
5 Признаки линьки	Не допускаются	Позднелизные шкурки со слегка поредевшей остью на боках или плечах	Ранневесенние порезы лые шкурки с поредевшей остью на боках или плечах, с грубоватой кожей	Ранневесенние, порезы с сильно поредевшей остью на боках и плечах, с грубой кожей
6 Недостача частей шкурки	Не допускаются	Головы или хвоста	Головы с шей	Вырезанного черева

Продолжение табл. 6

Наименование порока	Груша			
	первая	вторая	третья	четвертая
7 Исправленная с ьсм ка и первичная обработ	Ис допускаться	Шкурки, снятые плас том, плохо обезжирен ные, плохо просушен ные, мороженые, л. жалые	Шкурки лисицы черно- бурой 1 и размерной ка гегории с изреженным волосяным покровом на боках и шейной части вследствие перетянуто сти	Комовая сушка

Примечания

- 1 Допускается ушивка разрывов
- 2 Пороки на голове, лапах, шее, хвосте и череве оценивают не выше норм, установленных за недостатку этих частей
- 3 При различных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), оценивают один наиболее порок
- 4 Отсутствие белого конца хвоста («типа») пороком не считают
- 5 Характеристика пороков дана в приложении 2.

1.13. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья», или четырех пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.14. Оценку шкурок лисиц и корсака проводят в соответствии с приложением 3.

1.15. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 12266.

1.16. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бойтся сырости».

2. ПРИЕМКА

2.1. Шкурки лисиц и корсака принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают оценке по всем показателям внешнего вида и размеру в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста с погрешностью не более 0,5 см. Ширину шкурки измеряют посередине длины с погрешностью не более 0,5 см. Площадь шкурки определяют умножением ее длины на полную ширину.

3.2. Процент серебристости на шкурках лисицы черно-бурой определяют в зависимости от длины участка шкурки, на котором равномерно расположен серебристый волосяной покров:

за 100% принимают серебристость от ушей до основания хвоста;

за 90,0% — от середины шеи до основания хвоста;

за 60,0% — от нижнего края лопаток до основания хвоста;

за 30,0% — не менее $\frac{1}{3}$ длины шкурки.


3.3. Площадь пороков определяют путем вычисления площади прямоугольника, в который вписывается данный порок, с погрешностью не более 0,5 см².

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


Шкурки лисиц и корсака транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое


ПРАВИЛКИ ДЛЯ ШКУРОК ЛИСИЦЫ ЧЕРНО-БУРОЙ (1),
ЛИСИЦЫ КРАСНОЙ, ЛИСИЦЫ-КРЕСТОВКИ, ЛИСИЦЫ-СИВОДУШКИ (2)
И КОРСАКА



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ ШКУРОК ЛИСИЦ И КОРСАКА

1 Вытертое место — участок шкурки частично лишенный волосяного покрова в результате механических повреждений

2 Горелая шкурка — разрушение или потеря прочности кожной ткани плохо обезжиренной шкурки, сопровождающееся появлением коричневого оттенка в результате длительного хранения

3 Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.

4 Лежалая шкурка — шкурка с пожелтевшей или покрасневшей кожной тканью и матовым волосяным покровом в результате длительного хранения в неблагоприятных условиях

5 Мороженая шкурка — шкурка высушенная на морозе с рыхлой, утолщенной кожной тканью белого цвета

6 Плешина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате заболевания животного или разложения кожной ткани

7 Прелая шкурка — разложение кожной ткани шкурки в результате несвоевременного или неправильного хранения

8 Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.

9 Сквозной волос — обнажение корней волос

10 Шкурки, поврежденные молью, — повреждение волосяного покрова и кожной ткани личинками моли

11 Шкурки, поврежденные рожедом, — повреждение участков шкурки жуками и их личинками

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Таблица 7

Оценка качества шкурок лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака в процентах

Виды лисицы	1-й сорт				2-й сорт			
	Группа пороков				Группа пороков			
	первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
Лисица красная, корсак	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5
Лисица крестовка лисица сиводушка	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0

Продолжение табл. 7

Виды лисицы	3-й сорт			
	Группа пороков			
	первая	вторая	третья	четвертая
Лисица красная, корсак	50,0	45,0	37,5	25,0
Лисица-крестовка, лисица-сиводушка	50,0	45,0	37,5	25,0

Таблица 8

Оценка качества шкурок лисицы черно-бурой в процентах

Размерная категория шкурки	Цвет	Группа серебристости	Первый сорт				Второй сорт			
			Группа порока				Группа порока			
			первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
1	I	1	120,0	107,8	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
		2	96,0	86,4	72,0	48,0	76,9	69,1	57,6	38,4
		3	60,0	54,0	44,9	30,0	48,0	43,2	36,0	24,0
	II	1	91,8	82,6	68,9	45,9	73,4	66,1	55,1	36,7
		2	73,4	66,1	55,1	36,7	58,7	52,9	44,0	29,4
		3	45,9	41,3	34,4	23,0	36,7	33,6	27,5	18,4
2	I	1	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
		2	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0
		3	50,0	45,0	37,5	25,0	40,0	36,0	30,0	20,0
	II	1	76,5	68,9	57,3	38,3	61,2	55,1	45,9	30,6
		2	61,2	55,1	45,9	30,6	48,9	44,0	36,7	24,5
		3	38,3	34,4	28,7	19,1	30,6	27,5	23,0	15,3

Примечания.

1. Шкурки лисицы красной, черно-бурой, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков; весенние и поздневесенние с безжизненным, тусклым, поредевшим волосяным покровом, особенно на огулке, боках и плечах или с голым черевом; летние с низкой грубой остью почти без пуха и темно-синей кожной тканью; детенышей с пухлявым волосяным покровом; прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, а также шкурки лисицы черно-бурой, имеющие длину менее 60,0 см или ширину менее 12,5 см, с серебристостью волосяного покрова менее 30% ее длины; полуволосые с синей кожной тканью относят к нестандартным.

Нестандартные шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака оценивают не более 25% от качества шкурок первого сорта, 1-й группы пороков соответствующего кряжа, а нестандартные шкурки лисицы черно-бурой — не более 25% от качества шкурок первого сорта, 1-й группы пороков, II цвета, 1-й группы серебристости, 2-й размерной категории

2. Скидка от оценки по качеству, %:

за шкурки, снятые чулком, правленные кожной тканью наружу — 5;

за отсутствие каждой лапы — 2,5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центросоюзом СССР РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Сафонов, З. Х. Давлетов, Л. Д. Семакин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.12.89 № 3607

3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 1994 г. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 14174—79

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН- ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12266—89	1 15
ГОСТ 14192—77	1 16

Редактор *Т П Шашина*
Технический редактор *О Н. Никитина*
Корректор *Е А Богачкова*

Сдано в наб 03 01 90 Подп в печ 08 02 90 1,0 усл п л 1,0 усл кр отт 0,83 уч изд л
Тир 5000 Цена 5 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1475