



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОКОНЫ СЫРЫЕ (ЖИВЫЕ)
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

ГОСТ 8417—57

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

Редактор *Л. И. Уракоза*

Сдано в наб. 31/X 1972 г. Подп. в печ. 12/XII 1972 г. 0,375 п. л. Тир. 20000

Издательство стандартов, Москва. Д-22, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4194

**ГОСТ
8417—57**

**КОКОНЫ СЫРЫЕ. (ЖИВЫЕ)
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА**

Взамен
ГОСТ 3707—55
в части «коконов
сырых (живых)»

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 14/III 1957 г. Срок введения установлен

с 1/IV 1957 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Коконами сырьими (живыми) называются защитные оболочки тутового шелкопряда с живыми куколками внутри.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Коконы сырье (живые) тутового шелкопряда разделяются на коконы чистых пород и гибриды.

Цвет и форма, присущие коконам каждой породы и гибрида, характеризуются эталонами, которые утверждаются в установленном порядке.

В зависимости от качества сырье (живые) коконы делятся на четыре сорта: отборный, первый, второй и третий, качественные показатели которых должны соответствовать следующим требованиям:

Сорта коконов	Характеристика сырых (живых) коконов
Отборный	<p>Коконы высокопродуктивных белококонных пород тутового шелкопряда.</p> <p>Коконы белого однородного цвета, плотные, без дефектов, с формой, присущей данной породе или гибриду шелкопряда</p>
Первый	<p>Коконы плотные, без дефектов, однородные по цвету, с формой, присущей данной породе или гибриду шелкопряда.</p>

Внесен Министерством легкой промышленности ССР

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
Переиздание. Август 1972 г.

Сорта коконов	Характеристика сырых (живых) коконов
Второй	<p>Допускаются коконы с наличием на оболочке незначительных рубцов длиной не более 5 мм или атласности — гладкой поверхности на оболочке кокона размером не более 5 мм по наибольшему поперечнику</p> <p>Однородные по цвету, а также с отклонением от цвета, присущего коконам данной породы, плотные и менее плотные, без дефектов</p>
Третий	<p>Допускаются коконы с незначительным отклонением от формы, присущей коконам данной породы или гибрида шелкопряда, с поверхностным пятном на оболочке кокона диаметром не более 5 мм, с атласностью — гладкой поверхностью на оболочке кокона размером не более 10 мм по наибольшему поперечнику или рубцом длиной до 10 мм</p> <p>Разноцветные коконы с формой, присущей данной породе или гибридам шелкопряда, с непросвечивающимися оболочками, без дефектов, а также коконы разной плотности, с значительными отклонениями от формы, присущей данной породе или гибридам шелкопряда, коконы, имеющие поверхностное пятно или совокупность пятен размером в диаметре выше 5 мм, но не более одной четверти поверхности оболочки, а также атласность — гладкая поверхность на оболочке размером не более 15 мм по наибольшему поперечнику, рубец длиной не более 15 мм</p>

П р и м е ч а н и я

1 Плотность, однородность по цвету и дефектность оболочки определяются органолептически

2 Для гибрида тутового шелкопряда Оро × Асколансскую и Асколанская × Оро допускаются в первом сорте свойственные им оттенки согласно эталону

3 При наличии нескольких рубцов и гладких мест на оболочках сырых (живых) коконов сортность последних определяется по наибольшему размеру одного из рубцов или гладкой поверхности

2 Сортность сырых (живых) коконов определяется по характеристике оболочки

3 К браку относятся каконы со следующими крупными дефектами.

а) двойники — коконы, завитые двумя или большим числом гусениц;

б) коконы с нескуклившимися гусеницами;

в) дырявые — коконы, имеющие в оболочке отверстия разного происхождения,

г) атласистые — каконы с рыхлым строением оболочки;

д) пятнистые — коконы с одним или несколькими наружными пятнами, независимо от их происхождения, в совокупности более $\frac{1}{4}$ поверхности оболочки;

е) тонкостенные — коконы, у которых полюса или другие места оболочки просвечиваются, а также коконы, имеющие тонкую

легко сминающуюся оболочку, через которую просвечивается куколка;

ж) глухари — коконы с куколкой, присохшей к стенке оболочки;

з) коконы с внутренними пятнами;

и) заплесневельные — коконы со следами плесени, независимо от размера повреждения оболочки;

к) сильно атласные — коконы, имеющие гладкую поверхность оболочки размером более 15 мм или рубец длиной более 15 мм;

л) кара-пачах — коконы со сквозными пятнами, полученными от разложения погибших гусениц или куколок.

II. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4. Сырые (живые) коконы принимают от колхозов и других коконосдатчиков на заготовительных пунктах партиями. Партией считают любое количество сырых (живых) коконо^в, рассортированных на однородные цвета, полученных от выкормок тутового шелкопряда одного сезона, одной породы или одного гибрида, очищенных от сдира (шелковой ваты, обволакивающей кокон) и отсортированных от коконного брака и кара-пачаха. Сырые (живые) коконы доставляют на заготовительные пункты в твердой таре (корзинах или ящиках с отверстиями).

5. Для спределения качества сырых (живых) коконо^в от сдаваемой партии сортовой смеси отбирают средний образец весом не менее 500 г. Отбор образца производят не менее чем из пяти разных мест сдаваемой партии.

6. Определение качества коконо^в в среднем образце производят посредством просмотра каждого кокона в отдельности в соответствии с требованиями п. 1 настоящего стандарта.

Наличие глухарей, коконо^в с неокукившимися гусеницами и внутренними пятнами определяют путем просмотра и встряхивания каждого кокона.

7. Вес в кг (*G*) каждого сорта коконного брака и карапачаха сдаваемой партии сырых (живых) коконо^в сортовой смеси исчисляют по формуле:

$$G = \frac{A \times B}{B},$$

где:

A — вес сдаваемых сырых (живых) коконо^в в кг;

B — вес коконо^в каждого сорта, коконного брака, карапачаха в 500-граммовом образце в г;

B — вес среднего образца (500 г).

Примечание Транспортирование и хранение сырых (живых) коконо^в производятся в соответствии с правилами и нормами по заготовке и первичной обработке коконо^в тутового шелкопряда, утвержденными в установленном порядке.

Изменение № 1 ГОСТ 8417—57 Коконы сырье (живые) тутового шелкопряда
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 27.07.87 № 3179

Дата введения 01 05 88

Наименование стандарта изложить в новой редакции «Коконы тутового шелкопряда живые. Технические условия»;

«Alive silkworm cocoons Specifications»

Под наименованием стандарта проставить код ОКП 98 8921

Вводную часть изложить в новой редакции «Настоящий стандарт распространяется на живые коконы белококонных пород и гибридов тутового шелкопряда, заготовляемые базами первичной обработки коконон и их приемными пунктами шелководческих республик, кроме Узбекской ССР»

Определение некоторых терминов, применяемых в стандарте — по ГОСТ 3398—74»

Разделы I, II изложить в новой редакции

«I Технические требования

1 I Характеристики

1 I I Живые коконы должны быть рассортированы на сортовую смесь пря домыс и карапачах

(Продолжение см. с 356)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8417—57)

112 Живые коконы сортовой смеси в зависимости от качества оболочки подразделяют на отборный I, II и III сорта

1.12.1. К отборному сорту относят коконы белого однородного цвета, без дефектов, жесткие, с формой, присущей данной породе или гибриду

1.12.2 К I сорту относят коконы однородные по цвету, жесткие, с формой, присущей данной породе или гибриду, с рубцами длиной не более 5 мм каждый, с гладкими блестящими участками длиной не более 5 мм каждый

1.12.3 Ко II сорту относят коконы с незначительным отклонением от цвета и формы присущей данной породе или гибриду, менее жесткие, с поверхностным пятном или совокупностью пятен общим диаметром не более 5 мм, с рубцами длиной не более 10 мм каждый, с гладкими блестящими участками длиной не более 10 мм каждый

1.12.4 К III сорту относят коконы со значительным отклонением от цвета и формы присущей данной породе или гибриду, не жесткие, с поверхностным пятном или совокупностью пятен общей площадью не более 1/4 поверхности оболочки с рубцами длиной не более 15 мм каждый, с гладкими блестящими участками длиной не более 15 мм каждый, а также уродливые и тонкостенные, по характеристике поверхности оболочки отвечающие требованиям данного сорта

113 При наличии на поверхности оболочки кокона нескольких рубцов или гладких блестящих участков сорт его определяют по наибольшей длине одного из рубцов или гладких блестящих участков

(Продолжение см. с 357)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8417—57)

114 К прядомым относят коконы с поверхностным пятном или совокупностью пятен общей площадью более 1/4 поверхности оболочки, с рубцами длиной более 15 мм, с гладкими блестящими участками длиной более 15 мм а также коконы внутри пятнистые (с выступающими изнутри на поверхность оболочки пятнами независимо от их происхождения), атласистые, ватообразные, двойниковые, дырявые, недовитые, тонкополосные, незрелые, остроконечные с двумя заостренными полюсами оболочки, сильно уродливые, заплесневелые, затвердые и глухари

115 В живых кокаонах не допускается посторонняя примесь и вата сидир, обволакивающая кокон

12 Упаковка

121 Живые коконы упаковывают в чистые, сухие ящики, корзины, коробки.

122 Ящики и коробки должны иметь на четырех боковых стенках отверстия диаметром 10—15 мм, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга.

123 Масса нетто коконоов в каждой упаковочной единице не должна превышать 20,0 кг

2. Приемка

21 Приемку живых коконоов производят партиями Партией считают любое количество коконоов сортовой смеси, прядомых или карапачах, полученные от выкормок тутового шелкопряда одного сезона (весенний или летний) и одной породы или гибрида

2.2 Для определения качества от партии коконоов сортовой смеси отбирают объединенную пробу массой не менее 250 г.

23 Результаты определения качества коконоов распространяют на всю партию

24 Массу коконоов каждого сорта, прядомых и карапачаха в партии коконоов сортовой смеси (m_k) в килограммах вычисляют по формуле

$$m_k = \frac{m_1 m_3}{m_2},$$

где m_1 — масса партии коконоов сортовой смеси, кг,

m_2 — масса объединенной пробы, г,

m_3 — масса коконоов каждого сорта, прядомых или карапачаха в объединенной пробе, г.

(Продолжение см. с 358)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8417—57)

25 Партию коконов взвешивают и массу коконов каждого сорта прядомых и карапачаха, содержащихся в партии коконов сортовой смеси, вычисляют с погрешностью не более 50 г

Стандарт дополнить разделами — 3, 4

«3. Методы определения

3.1 Методы отбора проб

3.1.1 Для определения качества кокочков из разных мест партии отбирают не менее пяти точечных проб коконов общей массой не менее 250 г

3.1.2 Из точечных проб составляют объединенную пробу

3.2 Наличие в партии коконов сортовой смеси, посторонней примеси ваты-сдира, обволакивающей кокон, и карапачаха определяют внешним осмотром коконов объединенной пробы

3.3 Коконы объединенной пробы осматривают и встрихивают каждый в отдельности и в соответствии с характеристикой их оболочки рассортировывают на отборные, I, II и III сорта, прядомые и карапачах и отдельно взвешивают их с погрешностью не более 1 г

3.4 Результаты вычислений округляют следующим образом если первая из отбрасываемых цифр равна или более 5, по последнюю сохраняют цифру и увеличивают на единицу, если менее 5, то ее оставляют без изменения

4. Транспортирование и хранение

4.1 Живые коконы транспортируют в упакованном виде в чистых сухих, не зараженных вредителями транспортных средствах

4.2 Живые коконы хранят в ящиках или насыпью под навесами на асфальтированных или цементированных площадках, покрытых плотной тарной тканью, раздельно — сортовая смесь, прядомые и карапачах

4.3 Коконы сортовой смеси хранят раздельно по породам и гибридам тутошнего шелкопряда

4.4 При хранении насыпью коконы размещают в виде грядок сортовую смесь и прядомые — высотой соответственно не более 50 и 20 см и шириной в основании не более 75 см, карапачах — высотой не более 10 см и шириной в основании не более 100 см

При хранении коконов в ящиках их размещают на подтоварник высотой штабеля не более пяти рядов Расстояние между грядками и штабелями должно быть не менее 50 см

4.5 Срок хранения живых коконов от момента их приемки от хозяйства или индивидуального коконосдатчика до замаривания не должен превышать 2 сут

(ИУС № 12 1987 г.)

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Величина	Единица			
	Наименование	Обозначение		
		русское	международное	
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ				
ДЛИНА	мётр	м		m
МАССА	килограмм	кг		kg
ВРЕМЯ	секунда	с		s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А		A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЕЛЬВИНА	kelvin	K		K
СИЛА СВЕТА	кандела	кд		cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ				
Плоский угол	радиан	рад		rad
Телесный угол	стерадиан	ср		sr
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ				
Площадь	квадратный метр	м^2		m^2
Объем, вместимость	кубический метр	м^3		m^3
Плотность	килограмм на кубический метр	$\text{кг}/\text{м}^3$		kg/m^3
Скорость	метр в секунду	м/с		m/s
Угловая скорость	радиан в секунду	рад/с		rad/s
Сила; сила тяжести (вес)	ньютон	Н		N
Давление; механическое напряжение	паскаль	Па		Pa
Работа; энергия; количество теплоты	дюйль	Дж		J
Мощность; тепловой поток	вatt	Вт		W
Количество электричества; электрический заряд	кулон	Кл		C
Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	В		V
Электрическое сопротивление	ом	Ом		Ω
Электрическая проводимость	сименс	См		S
Электрическая емкость	фарада	Ф		F
Магнитный поток	вебер	Вб		Wb
Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	Г		H
Удельная теплоемкость	дюйль на килограмм-кельвин	Дж/(кг·К)		$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
Теплопроводность	ватт на метр-кельвин	Вт/(м·К)		$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Световой поток	люмен	лм		lm
Яркость	кандела на квадратный метр	кд/ м^2		cd/m^2
Освещенность	люкс	лк		lx

МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Множитель, на который умножается единица	Приставка	Обозначение		Множитель, на который умножается единица	Приставка	Обозначение	
		русское	международное			русское	международное
10^{12}	тера	Т	T	10^{-2}	(санти)	с	C
10^9	гига	Г	G	10^{-3}	милли	м	M
10^6	мега	М	M	10^{-6}	микро	мк	μ
10^3	нило	к	k	10^{-9}	нано	н	n
10^2	(гекто)	г	h	10^{-12}	пико	п	p
10^1	(дека)	да	da	10^{-15}	фемто	ф	f
10^{-1}	(дэци)	д	d	10^{-18}	атто	а	a

Примечание: В скобках указаны приставки, которые допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение [например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр].